

Wir kultivieren Lebensqualität

DEMECAN 24:01 CRESINA

KULTIVAR: CREAMY KEES (Karel's Haze x Cookies & Cream)



Inhaltsstoffe und potentielle Effekte

Die vorrangigen Wirkungen von THC^{1,2}: analgetisch, muskelrelaxierend, appetitanregend, antiemetisch, sedativ, anxiolytisch

Dominanz: DEMECAN 24:01 Cresina ist ein Hybrid, der zu jeweils 50% aus Indica und Sativa besteht.

ANREGEND





BERUHIGEND

Eigenschaften der Hauptterpene:

- Limonen wirkt antidepressiv³ und angstlösend⁴ und ist verantwortlich für das beliebte Zitronenaroma
- · Nerolidol wirkt beruhigend, muskelrelaxierend⁵ & antioxidativ⁶
- ß-Caryophyllen aktiviert den CB2-Rezeptor⁷ und wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend⁸
- ß-Myrcen wirkt entspannend⁹, schmerzlindernd und entzündungshemmend¹⁰

Literatur: Diewissenschaftlichen Arbeiten wurden nicht mit Produkten von DEMECAN durchgeführt; 1. Whiting, PF et al. Cannabinoids for medical use: A systematic review and meta-analysis, JAMA 313, 2456—2473 (2015). (Meta-Analyse) 2. Corey-Bloom, Jet al. Corey-Bloom, Jet al. (Effects of times fragrance on immunie function and despressive states. Neuroimmunomodulation 2: 174—180 (1995). 4. Carvalin-Feitas Mil and Costa M. Anxiolytic and advanced estance and essential oil from Circus aurantium L. Biol Pharm Bull 25: 1629—1633 (2002). (Präklinik) 5. Binet Let al. Recherches pharmocolynamiques et action spasmoylicity es) equelques action of spasmoylicity es algues algorishatiques. Anni Pharm F13 of 161—161 (1972). (Präklinik) 6. Noguein A Note of Antioxidant Effects of Nerolidol in Mice Hippocampus After Open Field Test. Neurochem Res 38: 1861—1870 (2013). (Präklinik) 7. Gersch Jet al. Beta-capophyllene is a dietary cannabinoid. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105: 9099–9104 (2008). (Präklinik) 8. Espaa A et al. β-Caryophyllene, a GB2-Receptor-Selective Phytocannabinoid, Suppresses Mechanical Allodynia in a Mouse Model of Antivertoviral-Induced Neuropathic Pain. Molectures 25: 1–20 (2020). (Präklinik) 9. do Vale TG et al. Central effects of item (immonene, constituents of essential oil dhemotypes from Lippia alba (Mill.) n.e. Brown. Phytomedis 7: 709–714 (2002). (Präklinik) 10. Cornetti BB et al. Myrcene mimits the peripheral analgesic activity of lemongrass tea, J Ethnopharmocol 34: 43–48 (1991). (Präklinik)

Anwendung

Die Umstellung von einer anderen Cannabisblüte mit abweichender THC-Konzentration auf die DEMECAN 24:01 Cresina ist über eine leichte Anpassung der Dosis und ohne erneute Antragstellung auf Kostenübernahme möglich.

Umstellung

Aroma

4

Vanille- und Teigaromen beim Einatmen sowie nussiger Limettengeschmack beim Ausatmen.

Creamy Kees ist eine "New School"-Kreuzung aus Karel's Haze und Cookies & Cream mit einem vielschichtigen Geschmacks- und Terpenprofil. DEMECAN 24:01 Cresina gehört zu den hoch-THC-haltigen Sorten, welche z. B. bei chronischen Schmerzen, Chemotherapiebedingter Übelkeit und Erbrechen, Appetitmangel und Schlafstörungen angewendet werden können.¹

Bundesdruckerel 03 15 TEIL II für die Apotheke zur Krankenkosse bzw. Kostenträger Musterkrankenkasse 01.01.1962 Patient, Dario Beispielstraße 8 12345 Beispielstadt lebriebestätten N Rp. (little Learn) Vertragsarztatempel •Cannabisblüten DEMECAN 24:01 Cresina 12 34 567 • 30 g, unzerkleinert • ······ 3 Dosierung (g): 0.3 - 0.3 - 0.3verdampfen und inhalieren 5554 123456789

Beispielrezept: Verordnung von DEMECAN 24:01 Cresina

Informéren Sie sich online über unsere verfügbaren Produkte. Das BtM-Rezept ist nach Ausstellung sieben Tage lang gültig.

- 1) Angabe des Produktes (PZN optional)
- 2 Angabe der Menge (Höchstmenge pro Monat 100g, darüber hinaus Ausnahmefälle mit "A" kennzeichnen)
- **3** Angabe der Verarbeitung (Optional: NRF Vorschrift; weitere Verarbeitungsvarianten finden Sie auf unserer Webseite)
- 4 Angabe der Dosierung mit eindeutigen Einzel- und Tagesgaben
- 5 Angabe der Anwendungsart und schriftliche Gebrauchsanweisung (Ist auf dem Rezept "gemäß schriftlicher Anweisung" vermerkt, so ist diese in der Apotheke vorzulegen, um das Rezepturarzneimittel entsprechend kennzeichnen zu können).

Weitere Informationen:

Mögliche Nebenwirkungen

In der Regel nur leichte Nebenwirkungen, welche nach Therapieeinstellung meist zurückgehen. Nachfolgend die am häufigsten berichteten¹:

- Schwindel
- Mundtrockenheit
- Übelkeit
- · Müdigkeit und Schläfrigkeit

Veröffentlichte Warnhinweise⁶

- Schwere psychiatrische Erkrankungen, insbesondere Psychosen
- Schwangerschaft und Stillzeit
- bestehende Überempfindlichkeit gegenüber einzelnen Komponenten von med. Cannabis Produkten
- Führen von Kraftfahrzeugen/Bedienen von Maschinen
- Fuhren von Kraftfahrzeugen/Bedienen von Maschinel
 Gebrauch von Beruhigungsmitteln und Schlafmitteln
- schwere Herz-Kreislauf Erkrankungen
- Einsatz starker CYP 3A4 Inhibitoren